

Bon usage des antibiotiques

Indicateur CAQES et Outils de l'OMEDIT

23/01/2020

Journée régionale des
Référénts en antibiothérapie

- EPP créée dans le cadre du **CAQES**
- Indicateur national (NAT_10) « Taux de traitements antibiotiques de plus de 7 jours non justifiés »
 - Objectifs :
 - Évaluer la **traçabilité** de l'indication
 - Evaluer le **suivi des recommandations** en termes de **durée de traitement** et la traçabilité de la justification en cas de recommandations non suivies
 - Proposition d'un référentiel = « Propositions de la SPILF pour des antibiothérapies plus courtes » (SPILF ; Info-antibio N°73 - mars 2017)

Résultats

- **13 %** d'antibiothérapies de plus de 7 jours non justifiées en 2018
 - 24 % dans les établissements SSR
 - 18 % en santé mentale
- 36 établissements « NA » (sur 116 établissements)
→ EPP non réalisée ?
- Disparités entre les types d'établissements

Type d'ETS	Taux (%)
Dialyse (n=1)	52,0
HAD (n=2)	47,8
MCO (n=43)	12,1
PSY (n=8)	17,9
SSR (n=26)	24,5
Tous ETS (n=80)	13,2

Limites de l'analyse de ces résultats

- Comparabilité des données déclarées par les établissements ? (méthodes / référentiels différents)
- Nombre de dossiers analysés faible
 - 39 établissements ayant analysé moins de 30 dossiers
- Erreur de compréhension ? (5 établissements avec 100 % d'antibiothérapies de + de 7 jours non justifiées)
- Formalisation de la justification ?
 - *Pas d'évaluation de la pertinence*

→ **Élément de preuve** demandé dans le cadre du **RE 2020** du CAQES
→ EPP à réaliser sur **30 dossiers**

Pour retrouver la boîte à outil « Antibiotiques » :
<http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/bao/baoantibiotiques>

Publié par Gauthier ALLAIS, le 02/12/2019 à 09:47:53

Actualités

- Ruptures d'antibiotiques et de vaccins : point sur la situation et proposition d'alternatives
 - Tableau Antibiotiques omedit (mâj) 23/10/19)
 - Tableau Vaccins et Immunoglobulines spécifiques omedit (mâj) 08/09/2019)

Adaptation des principaux anti-infectieux à la fonction rénale

- Antibiotiques omedit
- Antifongiques omedit


Plaquettes "Les bons réflexes en antibiothérapie"

- Les bons réflexes en antibiothérapie : plaquette d'information axée sur l'antibiothérapie de 1ère intention des infections respiratoires communautaires omedit

Messages clés sur le bon usage des antibiotiques

Tableau de suivi des ruptures

- Antibiotiques
- Vaccins et Immunoglobulines spécifiques
- Mise à jour régulière


RUPTURE DE STOCK ET/OU ARRÊT DE COMMERCIALISATION D'ANTIBIOTIQUES
 AU 20/01/2020
POINT SUR LES ALTERNATIVES

Antibiotiques	DCI	Date de rupture	Date de retour	Situation	Indications	Alternatives	Commentaires
AUGMENTIN IV 500mg/50mg	amoxicilline/ acide clavulanique	sept-19		<ul style="list-style-type: none"> • Hôpital : Distribution normale • Ville : Distribution contingentée 		<ul style="list-style-type: none"> • Hôpital : spécialités génériques • cf recommandations SPLIF/GPIP/SFP 2017 	SPLIF/GPIP/SFP 2017 : Amoxicilline/acide clavulanique IV; alternatives si pénurie
AUGMENTIN IV 1g/200mg	amoxicilline/ acide clavulanique	nov-17	oct-19	Remise à disposition normale			
AUGMENTIN IV 2g/200mg	amoxicilline/ acide clavulanique	nov-17	Retour à la normale en jan-20	<ul style="list-style-type: none"> • Hôpital : Distribution normale • Ville : Distribution contingentée 			
AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE IV 500mg/50mg, 2g/200mg SANDOZ	amoxicilline/ acide clavulanique	févr-18	mai-19	Remise à disposition normale			
AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE IV 1g/200mg SANDOZ	amoxicilline/ acide clavulanique	févr-18	mai-19	Remise à disposition normale			
AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE IV 500mg/50mg, 1g/200mg, 2g/200mg MYLAN	amoxicilline/ acide clavulanique	mai-18	juil-18	<ul style="list-style-type: none"> • Hôpital : rupture de stock • Ville : non commercialisé 			
Amoxicilline PANPHARMA 1 g	amoxicilline 1g	avr-19	mai-19	Remise à disposition à compter du 2 mai 2019			
BACTRIM 400 mg/ 80 mg cp	Sulfaméthoxazole/triméthoprime		-	Arrêt distribution hôpital		BACTRIM sol buvable BACTRIM FORTE 800/160 mg cp	
BACTRIM Sol inj pour perfusion - Amp de 5 ml	Sulfaméthoxazole/triméthoprime		nov-19	<ul style="list-style-type: none"> Tensions d'approvisionnement. Mise à disposition d'une spécialité importée 	<ul style="list-style-type: none"> • Traitement de 1ère intention de la pneumocystose sans alternative thérapeutique 	<ul style="list-style-type: none"> Bactrim® perfusion 400mg/5 ml + 80mg/5ml concentrato per soluzione per infusione, destinée au marché Italien. 	

Campagne SSP 2019

- Messages clés sur le bon usage des antibiotiques à destination des professionnels de santé et du grand public
- Validés par les antibioréférents régionaux
- Nombreuses réactions sur Twitter
- Diffusion connue dans 2 ETS de la région

Les avez-vous diffusées ?!

LE SAVIEZ-VOUS ?

**FINI LES FLUOROQUINOLONES
DANS LE TRAITEMENT DES
CYSTITES AIGÜES !**

- > Cystite aiguë simple : Fosfomycine trométamol en dose unique en première intention
- > Cystite aiguë à risque de complication : différer le traitement pour adapter d'emblée la molécule à l'antibiogramme

LES ANTIBIOTIQUES, ILS SONT PRÉCIEUX, UTILISONS-LES MIEUX

semaine de la sécurité des patients

omedit PAYS DE LA LOIRE

ars Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

CPias Pays de la Loire

MedQual

Pour plus d'informations, scannez le QR Code









Fiches de bon usage des antibiotiques à destination des patients

- Continuité des fiches « Voie orale » pour les anticancéreux par voie orale
- Cibler les antibiotiques avec une durée de traitement allongée

Fiche ZYDELIG® Patients
Groupe VOCC Bretagne / Pays de la Loire

Version V1-2 / Octobre 2019

ZYDELIG® idélalisib

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE		
	Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en hématologie ou maladie du sang. Il est disponible dans les pharmacies de ville . Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien. Votre pharmacien peut vous conseiller pour la prise de votre ou vos traitement(s).	
	Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien à la fin du traitement.	
PRESENTATIONS ET CONSERVATION		
Deux présentations disponibles, sous forme de flacons de 60 comprimés pelliculés (3 714 € TTC) dosés à :		
	100 mg, orange, de forme ovale et portant les inscriptions « GSI » et « 100 »	
		150 mg, rose, de forme ovale et portant les inscriptions « GSI » et « 150 »
	Conservez à température ambiante dans l'emballage d'origine hors de portée des enfants.	
MODE D'EMPLOI		
	La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de 150 mg deux fois par jour . Les comprimés de ZYDELIG® (idélalisib) sont à avaler en entier avec un verre d'eau en deux prises par jour au cours ou en dehors des repas. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure. Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.	
	Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés, ni mâchés ou croqués.	
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES		
	Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise de millepertuis (Hypericum perforatum) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...). N'hésitez pas à préciser à votre médecin tous médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.	
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.		
EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhée, inflammation du gros intestin	Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Suivez la prescription médicale dès la première diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, bouillons, boissons gazeuses, thé ou tisanes autorisés en prenant garde au risque d'interaction). Privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (dès 3 épisodes de diarrhées par jour).
Eruptions cutanées	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Évitez les expositions au soleil, protégez-vous en cas d'exposition (vêtements, écran solaire total).	Informez votre médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.










Fiches de bon usage des antibiotiques à destination des patients

- Que faire en cas d'oubli ?
- Quelles interactions médicamenteuses ?
- Quels sont les principaux EI ? Et quelles conduites à tenir ?

➤ Objectif 1^{er} semestre 2020

→ *Fiches CRIOGO adaptées en interne avec les antibioréférents du CHU de Nantes*

AMOXICILLINE+ ACIDE CLAVULANIQUE
AUGMENTIN® 500mg ou 1g : comprimé, sachet dose ou poudre pour suspension buvable
Ce médicament est un antibiotique
Ne pas interrompre un traitement ou modifier le rythme d'administration SANS AVIS MEDICAL

<p>QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous vous rendez compte de l'oubli dans les 3 heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez la dose et ne décalez pas l'heure de la prochaine prise. • Si l'oubli est supérieur à 3 heures, sautez la prise et prenez la suivante à l'heure habituelle. • Ne doublez pas la dose pour compenser l'oubli. 	<p>VOTRE POSOLOGIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • prises (s) à mg • fois par jour <u>pendant un repas</u> <input type="checkbox"/> Matin <input type="checkbox"/> Midi <input type="checkbox"/> Soir • Si sachets dose : prendre avec un ½ verre d'eau • Date de fin : 	<p>QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES ?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>TROUBLES GASTRIQUES :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nausées, vomissements, flatulences • Selles molles, diarrhée • Douleurs abdominales (douleurs gastriques) </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>EFFET NORMAL qui disparaît à l'arrêt du traitement CONTINUEZ LE MEDICAMENT</p>  </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <p>DIARRHÉES persistantes et/ou importantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparition de taches blanches </td> <td style="border: none;"> <p>CONTACTEZ VOTRE MEDECIN</p>  </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <p>INFECTIONS VAGINALES</p> </td> <td style="border: none;"> <p>CONTINUEZ LE MEDICAMENT</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <p>REACTIONS ALLERGIQUES importantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eruption cutanée, prurit, urticaire. • Œdème de Quincke : (gonflement de la gorge) </td> <td style="border: none;"> <p>URGENT CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT CONTACTEZ VOTRE MEDECIN</p>  </td> </tr> </table>	<p>TROUBLES GASTRIQUES :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nausées, vomissements, flatulences • Selles molles, diarrhée • Douleurs abdominales (douleurs gastriques) 	<p>EFFET NORMAL qui disparaît à l'arrêt du traitement CONTINUEZ LE MEDICAMENT</p> 	<p>DIARRHÉES persistantes et/ou importantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparition de taches blanches 	<p>CONTACTEZ VOTRE MEDECIN</p> 	<p>INFECTIONS VAGINALES</p>	<p>CONTINUEZ LE MEDICAMENT</p>	<p>REACTIONS ALLERGIQUES importantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eruption cutanée, prurit, urticaire. • Œdème de Quincke : (gonflement de la gorge) 	<p>URGENT CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT CONTACTEZ VOTRE MEDECIN</p> 
<p>TROUBLES GASTRIQUES :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nausées, vomissements, flatulences • Selles molles, diarrhée • Douleurs abdominales (douleurs gastriques) 	<p>EFFET NORMAL qui disparaît à l'arrêt du traitement CONTINUEZ LE MEDICAMENT</p> 									
<p>DIARRHÉES persistantes et/ou importantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparition de taches blanches 	<p>CONTACTEZ VOTRE MEDECIN</p> 									
<p>INFECTIONS VAGINALES</p>	<p>CONTINUEZ LE MEDICAMENT</p>									
<p>REACTIONS ALLERGIQUES importantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eruption cutanée, prurit, urticaire. • Œdème de Quincke : (gonflement de la gorge) 	<p>URGENT CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT CONTACTEZ VOTRE MEDECIN</p> 									
<p>QUELS SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS DES AUTRES MEDICAMENTS ?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>ANTICOAGULANT DE TYPE AVK</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>COUMADINE® PREVISCAN®</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <p>ALLOPURINOL</p> </td> <td style="border: none;"> <p>ZYLORIC®</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <p>METHOTREXATE</p> </td> <td style="border: none;"> <p>IMETH® NOVATREX®</p> </td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">Contrôles de l'INR (prises de sang) plus fréquents afin d'adopter la posologie. Risque accru de réactions cutanées Augmentation des effets toxiques hématologiques du méthotrexate</p>	<p>ANTICOAGULANT DE TYPE AVK</p>	<p>COUMADINE® PREVISCAN®</p>	<p>ALLOPURINOL</p>	<p>ZYLORIC®</p>	<p>METHOTREXATE</p>	<p>IMETH® NOVATREX®</p>	<p>INFORMATIONS PRATIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSERVATION : • Conservez le médicament dans un endroit sec, à température ambiante (<25°C) • Évitez les endroits humides tels que la salle de bain • Conservez hors de la vue et de la portée des enfants • ALCOOL : • Évitez la consommation de boissons alcoolisées pendant votre traitement 			
<p>ANTICOAGULANT DE TYPE AVK</p>	<p>COUMADINE® PREVISCAN®</p>									
<p>ALLOPURINOL</p>	<p>ZYLORIC®</p>									
<p>METHOTREXATE</p>	<p>IMETH® NOVATREX®</p>									

EPP Infection Urinaire


- Diffuser les recommandations 2018
 - *Encourager* les établissements à les *appliquer*
 1. **Traçabilité** du diagnostic dans le DP ?
 - *Justification*
 2. **Molécule** adaptée au diagnostic ?
 - *Pertinence*
 3. **Durée** adaptée au contexte clinique ?
 - *Respect des dernières recommandations*
- Objectif 2^{ème} semestre 2020

EPP RANCH

- EPP **R**égionale sur l'**AN**tibioprophylaxie en **CH**irurgie
- Proposition d'un **3^{ème} tour** d'EPP
 - Mise à jour de la plateforme e-FORAP : l'outil permettra de générer un rapport automatisé des résultats
 - Référentiel = protocole régional
- Campagne de communication du protocole régional
 - Objectif 2020

- En 2020 retrouvez chaque mercredi un Quiz sur le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux !



 **OMEDIT PaysdeLaLoire** @OmeditPdL · 23h
#OmediQuiz

Mme C. 50 ans, sans antécédents particuliers, se présente chez son médecin généraliste pour des brûlures mictionnelles et une pollakiurie. La bandelette urinaire est + avec présence de leucocytes et de nitrites. Quel est le traitement de première intention?

Ciprofloxacin	11.5%
Fosfomycine trométamol	79.5%
Pivmécillinam	5.1%
Cefixime	3.8%

78 votes · 1 jour restant

1 4 2

- Réponse les vendredis !

omedit

PAYS DE LA LOIRE 

Merci de votre attention



www.omedit-paysdelaloire.fr



omedit.pdl@chu-nantes.fr



[@OmeditPdl](https://twitter.com/OmeditPdl)